

# دھان

## خوشحال کسان

زمینی اصلاح اور پودے کو غذائی اجزاء کی ترسیل۔ **رُوٹ فِیڈ + / لِبِنڈ مِلَس**

**رُوٹ فِیڈ +** ایک نامیاتی کھاد ہے جس میں نامیاتی مادہ، سی ویڈ، سلفر، زنک، پوناش، میگنیشیم اور دوسرے غذائی اجزاء شامل ہیں۔

**رُوٹ فِیڈ +** غذائی سٹوریج، ضروری غذائی اجزاء کی بہترین ترسیل۔

**لِبِنڈ مِلَس** پوناش، ہیومک ایسڈ اور فلوک ایسڈ کا مرکب ہے۔

**لِبِنڈ مِلَس** زمین کی ساخت میں بہتری اور پانی کھڑا رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ۔

طریقہ استعمال: زمین کی تیاری کے وقت **رُوٹ فِیڈ +** 1 بیگ

یا **لِبِنڈ مِلَس** 1 بیگ فی ایکڑ دیگر کھادوں کے ساتھ آخری بل سے پہلے چھڑ دیں۔



پودے اور زمین کے افعال کی درستگی۔ **ریبارن**

**ریبارن** پوناش، ہیومک ایسڈ اور فلوک ایسڈ کا مرکب ہے۔

**ریبارن** کدو کو رکھے نرم، جڑوں کی نشوونما اور پھیلاؤ میں اضافہ۔

**ریبارن** پودے کی جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔

**ریبارن** پودے پر موسمی اور جسمانی سٹریس (اینٹی آکسیڈنٹ) کا خاتمہ کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: چھیری کی منتقلی کے 15 تا 20 دن بعد 4 لیٹر فی ایکڑ فگڑ کریں۔



جڑی بوٹیوں کا اُگنے سے پہلے خاتمہ۔ **بیننا کلور**

**بیننا کلور** دو جدید زہروں پر بنیٹا کلور اور بنسلفیوران کا کیمپور۔

**بیننا کلور** جڑی بوٹیوں کی جڑ اور پتوں سے جذب ہو کر جڑی بوٹیوں کی نشوونما روک دیتا ہے۔

**بیننا کلور** گھاس نما، چوڑے پتے اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول۔

طریقہ استعمال: 300 گرام فی ایکڑ چھیری کی منتقلی کے 24 گھنٹے کے اندر 6 لیٹر پانی میں محلول بنا کر فیکر بوتل

کے ساتھ کھڑے پانی میں استعمال کریں۔

# دھان

## خوشحال کسان

بیکٹیریل بلائیٹ کا مکمل کنٹرول۔ **سپاٹ فکس سپر**

**سپاٹ فکس سپر** آگزن کا پر اور ٹیٹرا مائی سین پر مشتمل منفر د اور طاقور کیمسٹری۔

**سپاٹ فکس سپر** بیماری پیدا کرنے والے جرثومے کے انزائمز اور پروٹین بنانے والے نظام کو تباہ کر دیتی ہے

اور بیماری کو آنے اور پھیلنے سے روکتی ہے۔

**سپاٹ فکس سپر** بیکٹیریل بلائیٹ کا مکمل خاتمہ اور بہترین پیداوار۔

طریقہ استعمال: چھیری منتقلی کے 50 سے 60 دن بعد 200 ملی لیٹر فی ایکڑ پھرے کریں۔



بلاسٹ، براؤن لیف سپاٹ اور شیتھ بلائیٹ سے نجات۔ **رمبیل**

**رمبیل** سرایت پذیری، پتوں کے آر پار ہونے، حفاظتی اور معالجاتی خاصیت۔

**رمبیل** دھان میں بلاسٹ، براؤن سپاٹ، گلاؤ اور شیتھ بلائیٹ کا شاندار کنٹرول۔

**رمبیل** پیپونڈی میں سیل ممبرین اور انرجی کے نظام کو مکمل تباہ کر دیتی ہے۔

طریقہ استعمال: چھیری منتقلی کے 65-70 دن بعد یا بیماری کے سازگار ماحول میں 100 ملی لیٹر فی ایکڑ پھرے کریں۔



ڈائریکٹر سٹور: 0321-7373355  
جنرل منیجر سٹور اینڈ مارکیٹنگ: 0301-8387744  
سٹور منیجر (پاکستان، سماجیہ اہل، فیصل آباد): 0300-0308225  
زومل منیجر (سرگودھا): 0300-0645867  
سٹور منیجر (لاہور، سیالکوٹ، ناروال): 0302-8380380

سٹور منیجر (بہاولپور، بہاولنگر): 0300-0308226  
سٹور منیجر (ڈی بی خان، ملتان، علی پور): 0300-0308228  
سٹور منیجر (رحیم یار خان، سکس، لاڑکانہ): 0302-8381113  
سٹور منیجر (حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، کراچی): 0302-8381117

## تمام سخت جان جڑی بوٹیوں کا ایک ہی سپرے میں خاتمہ۔ **میٹیور**

**میٹیور** دو جدید مائیکروبائیو پائز اور سلفورون اور ہسپارٹی بیگ سوڈیم کا مکسچر۔  
**میٹیور** جڑی بوٹیوں میں امانو ایڈ کے بننے اور انزائم کو ختم کر کے ان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔  
**میٹیور** دھان کی تمام جڑی بوٹیوں ڈیلا، ڈھڈن، ٹرو، ڈیلا، سواگی اور تمام چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے بعد جب جڑی بوٹیاں 2 سے 3 پتوں پر ہوں 100 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔  
نرسری میں جڑی بوٹیوں کے لئے جڑی بوٹی اگلنے پر 20 گرام فی ٹینگی سپرے کریں اور اگلے دن پانی لگائیں۔



## گھوڑا گھاس اور سخت جان جڑی بوٹیوں کا خاص حل۔ **ہائی مور**

**ہائی مور** منفرد ذہروں میں مینائی فاپ اور سائی ہیلو فاپ بیوٹائل پر مشتمل جدید کیمسٹری۔  
**ہائی مور** چاول میں موجود سخت جان جڑی بوٹیاں جیسے سواگی، ڈھڈن، مورک (ڈیلا)، چاولی خصوصاً گھوڑا گھاس کا مکمل کنٹرول۔  
**ہائی مور** سرایت پذیری اور پودے کے اندر آسانی سے جذب ہو کر جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو فوری طور پر روک دیتا ہے۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے بعد جب جڑی بوٹیاں 2 سے 3 پتوں پر ہوں 400 سے 600 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔  
نرسری میں جڑی بوٹیوں کے لئے جڑی بوٹی اگلنے پر 125 ملی لیٹر فی ٹینگی سپرے کریں۔



## دھان کی بہترین بڑھوتری اور بھرپور پیداوار کے لئے۔ **تارازنک 27 / تارازنکو**

جدید ترین پلانٹ پر تیار کردہ، زنک کی پوری مقدار۔  
جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔  
ضیائی تالیف اور پوری نیشن کے عمل کو تیز کرتا ہے۔  
بڑھوتری کے ہارمون (آگزن) بنانے میں کردار ادا کر کے نشوونما میں باقاعدگی اور توازن۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 12 سے 18 دن بعد **تارازنک 27** بحساب 3 کلوگرام فی ایکڑ  
یا **تارازنکو** بحساب 5 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



## زنک اور دوسرے ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی۔ **زاگ گولڈ**

**زاگ گولڈ** زنک، آئرن اور میگنیز پر مشتمل ملٹی مائیکرو نیوٹریٹ۔  
**زاگ گولڈ** انزائمز کی کارکردگی، ضیائی تالیف، عمل تنفس اور کلوروفیل بنانے میں اہم کردار۔  
**زاگ گولڈ** اجزائے صغیر کی فراہمی، فصل سرسبز و شاداب، بھرپور پیداوار اور زیادہ منافع۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 12 تا 18 دن بعد 5 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



## دانوں کی متوازن بھرائی اور وزن کے لئے۔ **تارافکسر**

**تارافکسر** پتوں میں جمع شدہ خوراک کی مونجر کی طرف ترسیل کرتی ہے۔  
**تارافکسر** عمل زیرگی میں معاونت اور نشوونما بڑھا کر پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔  
**تارافکسر** مونجر میں خالی دانوں کا بہترین حل۔  
**تارافکسر** دانوں کی لمبائی، موٹائی اور وزن میں اضافہ۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 50 سے 55 دن بعد **تارافکسر** بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔



## ٹوٹے سے محفوظ، شاندار اور چمکدار چاول۔ **تاراکنگ / ٹرائی پاور / لینڈسٹار**

**تاراکنگ** متوازن کھاد، نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش پر مشتمل مکمل حل پذیر کھاد۔  
**ٹرائی پاور** نائٹروجن اور پوٹاش پر مشتمل مکمل حل پذیر کھاد۔  
**لینڈسٹار** حل پذیر پوٹاش کھاد ڈال کر کوالٹی اور پیداوار بڑھائیں۔  
فوری فراہمی، جذب زیادہ نتیجہ بہترین نشوونما، بڑھوتری اور مونجر کی بھرپور بھرائی۔  
دانے کے سائز اور کوالٹی میں اضافہ نتیجتاً زیادہ پیداوار اور منافع۔  
دانے وزن دار، صحت مند اور ٹوٹے سے محفوظ جس سے پیداوار میں اضافہ۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 65 تا 70 دن بعد **تاراکنگ / ٹرائی پاور** 05 کلوگرام یا **لینڈسٹار** 3 لیٹر ہڈ کریں۔  
یا **تاراکنگ / ٹرائی پاور** 1 کلوگرام یا **لینڈسٹار** 1 لیٹر سپرے کریں۔



## تنے کی سنڈی کے خاتمہ کے لئے جدید کیمسٹری۔ **اپناڈان**

**اپناڈان** تنے کی سنڈیوں کا مکمل اور موثر حل۔  
**اپناڈان** سرایت پذیری اور ٹرانسلیمینر خاصیت کی بدولت دھان کی فصل میں موجود تنے کی سنڈی اور جڑی سفید سنڈی کا مکمل خاتمہ۔  
**اپناڈان** سنڈیاں حرکت اور کھانا بند کر دیتی ہیں اور مفلوج ہو کر مر جاتی ہیں۔  
**اپناڈان** تنے کی سنڈیوں کے ساتھ ساتھ پتہ لپیٹ سنڈی کا مکمل خاتمہ۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 20-25 دن کے بعد بحساب 6 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



## تنے کی سنڈی کا موثر کنٹرول۔ **تاراپائیدان**

**تاراپائیدان** تنے کی سنڈیوں اور پتہ لپیٹ سنڈی کا مکمل اور موثر حل۔  
**تاراپائیدان** سرایت پذیری، چھونے اور کھانے سے متاثر کرنے کی خاصیت۔  
**تاراپائیدان** سنڈیوں کے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے اور مفلوج ہو کر مر جاتی ہیں۔  
**تاراپائیدان** ہر دانہ گرو تھریگولیر کے ساتھ جوڑ کھے فصل کو سرسبز و شاداب۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 45-50 دن کے بعد بحساب 9 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



## پتہ لپیٹ سنڈی اور تنے کی سنڈی کا خاتمہ۔ **تاراجن / سپرلاک**

جدید اور طاقتور ذہروں پر مشتمل ہائڈکیمسٹری، سرایت پذیری اور پتوں کے آر پار ہونے کے باعث پتہ لپیٹ سنڈی اور تنے کی سنڈی کو کھانے اور چھونے سے مارتی ہیں۔  
**تاراجن** سنڈی کو فوری مفلوج کر دیتی ہے جس سے وہ کھانا پینا اور فصل کو نقصان پہنچانا بند کر دیتی ہیں اور بھوک کے باعث مر جاتی ہیں۔  
**سپرلاک** کیڑے میں جلد بننے کے عمل کو اور کیڑے کا سٹیج بدلنے سے روکتی ہے اور کیڑے کو فالج کر کے اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔  
طریقہ استعمال: پتہ لپیٹ سنڈی نظر آنے پر فوری **تاراجن** 100 ملی لیٹر فی ایکڑ یا **سپرلاک** 250 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



## براؤن ہاپر اور سفید پشت والے تیلے کے لئے جدید کیمسٹری۔ **بارکو**

**بارکو** دو انتہائی طاقتور ذہروں ڈائی نوٹھیوران اور پائی میٹرو زین پر مشتمل جدید اور ہائڈکیمسٹری۔  
**بارکو** ہاپرز کے اعصابی نظام اور رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے۔  
**بارکو** اعصابی پیغامات کی ترسیل کو روک دیتا ہے جس سے ہاپرز حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں اور جو ان کی موت کا سبب بنتی ہے۔  
**بارکو** ہاپرز خاص کر براؤن ہاپر اور سفید ہاپر کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لئے بہترین انتخاب۔  
طریقہ استعمال: پنیری منتقلی کے 60 تا 65 دن بعد 150 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔

