



ہر مرحلے میں یکجہداشت
مکمل حفاظت اور بہترین پیداوار

کیپاس



زمین کی زرخیزی اور طاقت کی بحالی کا آغاز۔ **رُوٹ فِیڈ + / لینیڈ مِکس**

رُوٹ فِیڈ + ایک نامیاتی کھاد ہے جس میں نامیاتی مادہ، سی ویڈ، سلفر، زنک، پوناش، میگنیشیم اور دوسرے غذائی اجزاء شامل ہیں۔

رُوٹ فِیڈ + غذائی ستور تاج، ضروری غذائی اجزاء کی بہترین ترسیل۔

لینیڈ مِکس پوناش، ہیومک ایسڈ اور فلوک ایسڈ کا مرکب ہے۔

لینیڈ مِکس زمین کی ساخت میں بہتری اور ترقی قائم رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ۔

طریقہ استعمال: بوقت بھائی **رُوٹ فِیڈ + 1** بیگ یا **لینیڈ مِکس 1** بیگ

فی ایکڑ دیگر کھادوں کے ساتھ چھوٹ کریں۔



زمین اور پودے کے افعال کی درستگی۔ **ریبارن**

ریبارن پوناش، ہیومک ایسڈ اور فلوک ایسڈ کا مرکب ہے۔

ریبارن زمین نرم اور بھری، جڑوں کی نشوونما اور پھیلاؤ میں اضافہ۔

ریبارن کھادوں کی افادیت میں کئی گنا اضافہ۔

طریقہ استعمال: دوسرے یا تیسرے پانی پر 4 لیٹر فی ایکڑ قلد کریں۔

زمینی بیماریوں اور ابتدائی رس چوسنے والے کیڑوں کا تدارک۔ **جوپیٹر**

جوپیٹر تین زہروں پر مشتمل کپاس کے بیج کو لگانے والا مرکب زہر ہے۔

جوپیٹر ابتدائی مرحلے میں فیوزیریم ولٹ، روٹ رات اور ابتدائی رس چوسنے والے کیڑوں کو تھریس، جیسڈ اور سفید کھی سے محفوظ رکھتی ہے۔

جوپیٹر بیج کے آگے اور کسانیت میں توازن پیدا کر کے بہترین پیداوار کی طرف پہلا قدم۔

طریقہ استعمال: 80 لیٹر **جوپیٹر** فی ایکڑ بیج کو لگائیں، سائے دار جگہ پر خشک کریں اور پھر کاشت کریں۔



آگاہ سے پہلے جڑی بوٹیوں سے پاک کپاس۔ **اینراگولڈ**

اینراگولڈ دو طاقتور جڑی بوٹی مارزہروں کا مرکب۔

اینراگولڈ جڑی بوٹی کی نئی کونٹول اور جڑوں کا ٹکنا بند کر کے آگے سے روکتی ہے۔

اینراگولڈ کپاس کی چوڑے پتوں اور نوکیلے پتوں والی بوٹیوں کا ایک حل۔

اینراگولڈ فصل سے بھرپور مطابقت۔ بہتر آگاہ، شاندار پیداوار۔

طریقہ استعمال: بھائی کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر بحساب 650 لیٹر فی ایکڑ پھرے کریں۔



ہر گڈی کھلے اور ٹینڈے بھی شاندار۔ **تارا فکسر**

تارا فکسر: پتوں میں جمع شدہ خوراک کی ٹینڈے کی طرف ترسیل کرتی ہے۔

تارا فکسر: بھرپور پھولوں کے لئے بہترین ٹانک، چھل پھول چھڑنا بند۔

تارا فکسر: زیادہ وزن دار اور صحت مند ٹینڈے۔

طریقہ استعمال: پہلا پھرے 30 دن بعد بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ اور دوسرا پھرے 15 دن کے وقفے سے کریں۔

ٹینڈے کا سائز اور وزن بڑھانے کے لئے۔ **تارا کنگ / ٹرائی پاور / تارا گرین**

ٹائیٹر وجن، فاسفورس اور پوناش پر مشتمل متوازن کھاد۔

کامل حل پذیر اور مکمل طور پر پودے میں جذب ہوتا ہے۔

ٹینڈے میں ریشے کی لمبائی بڑھانے اور پختگی میں کردار ادا کرتا ہے۔

پودے کی نشوونما، بڑھوتری اور ٹینڈے کی بھرائی میں توازن پیدا کر کے پیداوار بڑھانے۔

طریقہ استعمال: بھائی کے 60 تا 70 دن بعد اور بھائی کے 90 تا 100 دن بعد 05 کلوگرام فی ایکڑ قلد یا 1 کلوگرام فی ایکڑ پھرے کریں۔



ٹینڈے کھلے پھٹی، ہر پودا صحت مند اور سٹریس مینجمنٹ کے لئے۔ **تارا سپر / بی سی سٹا**

فصل کو ضروری اجزاء کی فراہمی۔ فزٹیلٹی اور رپر وڈکشن میں اضافہ۔

تارا سپر: لمانو ایسڈ زور اجزائے کبیرہ کی بیک وقت فراہمی۔

بی سی سٹا: ایک بائیو سٹیمولینٹ ہے جس میں پودے کے ضروری گروتھ ریگولیٹرز اور تمام وٹامن شامل ہیں۔

طریقہ استعمال: بھائی کے 30 تا 40 دن بعد یا کسی بھی مرحلہ پر **تارا سپر** 1000 ملی لیٹر

یا **بی سی سٹا** 400 ملی لیٹر فی ایکڑ پھرے کریں۔



ڈار کٹر نیلز 0321-7373355
جزل نیلز نیلز اینڈ مارکیٹنگ 0301-8387744
نیلز نیلز (پاکستان، ساہیوال، فیصل آباد) 0300-0308225
زول نیلز (سرگودھا) 0300-0645867
نیلز نیلز (لاہور، سیالکوٹ، ناروال) 0302-8380380

نیلز نیلز (بہاولپور، بہاولنگر) 0300-0308226
نیلز نیلز (ڈی ٹی خان، ملتان، علی پور) 0300-0308228
نیلز نیلز (رحیم یار خان، سکھر، لاہور) 0302-8381113
نیلز نیلز (حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، کراچی) 0302-8381117

UAN: +92-42-111-22-33-88 Web: www.taragroup.com.pk



سفید مکھی کی تمام حالتوں کا مکمل خاتمہ۔ **مٹیک** (درمیانہ اور آخری مرحلہ)

مٹیک سرایت پذیری، بخاراتی عمل اور پتوں میں آر پار ہونے کی خاصیت۔
مٹیک زائیکم اور فلوٹم دونوں میں حرکت کے باعث فوری اور دیر پا اثر۔
مٹیک رس چوسنے والے کیڑوں خاص کر سفید مکھی (انڈے، بچے، بالغ) کا مکمل صفایا۔
مٹیک سبز تیلے اور جوں کا بھی موثر خاتمہ۔

طریقہ استعمال: سفید مکھی اور سبز تیلے کی معاشی حد پر فوری 200 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔



تھرپس اور سبز تیلے کا خاتمہ لائے فصل میں ہریالی۔ **ڈوفائین**

ڈوفائین وسیع الاثر کیڑے مارہر۔

ڈوفائین سرایت پذیری اور پتوں میں آر پار ہونے کی خاصیت۔

ڈوفائین چھوٹے اور چوسنے سے بھی تھرپس اور سبز تیلے کا مکمل خاتمہ۔

ڈوفائین دماغ سے پیغامات کی ترسیل اور انرجی کے نظام کو تباہ کر کے کیڑوں کو مفلوج کر دیتی ہے جس کی بدولت دسے فوری اور دیر پانجامت۔

طریقہ استعمال: فصل کے ابتدائی مرحلہ میں تھرپس اور سبز تیلے کی معاشی حد پر فوری 120 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



آخری مرحلے میں سفید مکھی کا مکمل خاتمہ۔ **رینڈم** (آخری مرحلہ)

رینڈم: اینٹا میپرز اور سپائز ٹیٹرا میٹ پر مشتمل منفر دیکمیسٹری۔

رینڈم: سفید مکھی کے انڈوں، بچوں اور بالغ مکھی کو چھونے اور چوسنے سے متاثر کر کے مارتا ہے۔

رینڈم: سرایت پذیری اور پتوں میں آر پار ہونے کی خاصیت اور وسیع طریقہ اثر۔

طریقہ استعمال: سفید مکھی کی معاشی حد 150 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



سبز تیلے پر فوری کنٹرول۔ **جینی ٹاکس سپی / بارکو**

جینی ٹاکس سپی: سرایت پذیری اور پتوں کے آر پار ہونے کے باعث سبز تیلے کے بچے اور بالغ کو چھونے اور چوسنے سے مارتا ہے۔

سبز تیلے کے اعصابی نظام اور رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے۔

سبز تیلے کے مکمل خاندان کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لئے بہترین انتخاب۔

طریقہ استعمال: سبز تیلے کی معاشی حد پر فوری **جینی ٹاکس سپی** 60 گرام

یا **بارکو** 150 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



ہسبل منفر دیکمیسٹری۔ مارے سفید مکھی (آخری مرحلہ)

ہسبل: فلوئیکاڈ اور اینٹا میپرز جیسے طاقتور زہروں پر مشتمل جدید مرکب۔

ہسبل: سفید مکھی کے بچوں اور بالغ مکھی کو چھونے اور چوسنے سے متاثر کر کے مارتا ہے۔

ہسبل: پتوں میں آر پار اور پودے میں سرایت پذیری ہونے کی خاصیت۔

ہسبل: اعصابی نظام اور رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: سفید مکھی کی معاشی حد 200 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



کرنچ سپر کا اثر۔ سفید مکھی بے اثر (ابتدائی مرحلہ)

کرنچ سپر: بہترین سرایت پذیری کے باعث پتوں کے آر پار ہونے کی خاصیت۔

کرنچ سپر: چھونے اور چوسنے سے سفید مکھی اور سبز تیلے کو ختم کرنے کے لئے انتہائی موثر ہے۔

کرنچ سپر: سبز تیلے اور سفید مکھی کے بچوں اور بالغ کی موت کا سبب بنتی ہے۔

کرنچ سپر: کیڑے کی رس چوسنے والے اعضاء اور اعصابی نظام کو ناکارہ کر دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: سفید مکھی اور سبز تیلے کی معاشی حد پر فوری 60 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔

تمام بال و مرز سے نجات۔ **تارا جن / سپر لاک**

جدید اور طاقتور زہروں پر مشتمل باثر کیمیسٹری، سرایت پذیری اور پتوں کے آر پار ہونے کے باعث تمام بال و مرز کو کھانے اور چھونے سے مارتی ہیں۔

تارا جن: سنڈیاں مفلوج اور فوری طور پر کھانا پینا اور فصل کو نقصان پہنچانا بند کر دیتی ہیں اور بھوک کے باعث مر جاتی ہیں۔

سپر لاک: سنڈیوں میں جلد بننے کے عمل کو اور کیڑے کا سٹیج بدلنے سے روکتی ہے اور کیڑے کو قانع کر کے اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔

طریقہ استعمال: نقصان نظر آتے ہی فوری **تارا جن** بحساب 100 ملی لیٹر فی ایکڑ

یا **سپر لاک** 250 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



سفید مکھی کے لائف سائیکل کو توڑے۔ **وودو** (ابتدائی اور درمیانہ مرحلہ)

وودو: فلوئیکاڈ اور پائپر و کسٹین جیسے وسیع الاثر زہروں پر مشتمل جدید کیمیسٹری۔

وودو: سفید مکھی (بالغ، انڈے، بچے)، سبز تیلے اور تھرپس کا مکمل کنٹرول۔

وودو: پتوں میں آر پار اور پودے میں سرایت پذیری ہونے کی خاصیت۔

وودو: مادہ کے انڈے دینے کی صلاحیت، اعصابی نظام کو متاثر کرنے کے علاوہ رس چوسنے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتی ہے۔

طریقہ استعمال: سفید مکھی، سبز تیلے اور تھرپس کی معاشی حد پر فوری 300 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



ہائی بیسٹ لاؤ۔ سفید مکھی اور سبز تیلے سے نجات پاؤ۔ (ابتدائی اور درمیانہ مرحلہ)

ہائی بیسٹ: سفید مکھی (بچوں اور انڈوں) اور سبز تیلے کی تمام حالتوں کا مکمل خاتمہ کرے۔

ہائی بیسٹ: پتوں میں آر پار اور پودے میں سرایت پذیری ہونے کی خاصیت۔

ہائی بیسٹ: سفید مکھی اور سبز تیلے کی نشوونما میں رکاوٹ اور اعصابی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔

ہائی بیسٹ: رچر وڈ کنو (نسلیں پیدا کرنے) صلاحیت میں کمی لاتا ہے، جو انڈوں اور بچوں کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔

طریقہ استعمال: سفید مکھی اور سبز تیلے کی معاشی حد پر فوری 120 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



بہترین غذا، زیادہ پیداوار۔ **ایکسٹرافاس**

ایکسٹرافاس: نائٹروجن اور فاسفورس پر مشتمل بہترین کھاد جو کھپاس کی نشوونما اور گروتھ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

ایکسٹرافاس: پانی میں حل پذیر اور فصل کو فوری غذائی اجزاء کی فراہمی۔ مضبوط جڑیں اور نتا۔

ایکسٹرافاس: تیز پختگی کی بنا پر شور، گلر اٹھی اور پکی زمینوں کو نرم اور بھڑ بھڑاتا ہے۔

طریقہ استعمال: بجائی کے 25 سے 30 دن کے بعد 10 کلو گرام فی ایکڑ ڈالیں۔