



آٹونیکس

آٹونیکس سے کی سٹڈی کے خاتمہ کے لئے جدید کیمسٹری
 آٹونیکس سے کی سٹڈیوں کا مکمل اور موثر عمل۔
 آٹونیکس سرایت پذیری اور اثر اسٹری خاصیت کی بدولت دھان کی فصل میں موجود سے کی سٹڈی اور جڑ کی سفید سٹڈی کا مکمل خاتمہ۔
 آٹونیکس کیچھ ہی ٹھوس میں سٹڈیاں حرکت اور کھانا بند کر دیتی ہیں اور پھر سے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد منظوم ہو کر مر جاتی ہیں۔
 آٹونیکس سے کی سٹڈیوں کے ساتھ ساتھ پتہ پیٹ سٹڈی کا مکمل خاتمہ۔
 آٹونیکس ڈالنے کے 4 گھنٹے بعد بھی اگر بارش ہو جائے تو اس کا اثر ڈائل نہیں ہوتا۔
 طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے 50 سے 55 دن کے بعد بحساب 6 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



لائینو

لائینو نئی اور منفرد کیمسٹری۔ شائد اس طرح
 لائینو دھان کی تمام سٹڈیوں خصوصاً پتہ پیٹ سٹڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین۔
 لائینو سرایت پذیری اور پتوں میں آر پار ہونے کے باعث پتوں کے نیچے اور سٹے کے اندر چھپی ہوئی سٹڈیوں کی موت کا بھی سبب بنتی ہے۔ ہار زکا اضافی کنٹرول۔
 طریقہ استعمال: منتقلی کے 55-60 دن بعد پتہ پیٹ سٹڈی نظر آنے پر فوری 100 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اچھی طرح پھرسے کو چھینیں بنائیں۔



تھامسن پلس

تھامسن پلس ایک منفرد فارمولیشن اور ہارڈ کیمسٹری۔
 تھامسن پلس سٹڈی کے اعصابی نظام میں پروٹین کو ہلاک کر کے کیڑے کو فوج کرتی ہے۔
 تھامسن پلس اعصابی پیغامات کی ترسیل کو روک دیتی ہے جس سے پتہ پیٹ سٹڈی حرکت کرنا بند کر دیتی ہے اور جو اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔
 تھامسن پلس دیگر سٹڈیوں اور ہارڈ زکا بھی موثر کنٹرول۔
 طریقہ استعمال: پتہ پیٹ سٹڈی ظاہر ہونے پر فوری 100 لیٹر فی ایکڑ پھرسے کریں۔



بارکو

بارکو دو انتہائی طاقتور زہروں نائٹین پارم اور پائیمپٹرولین پر مشتمل جدید اور ہارڈ کیمسٹری۔
 بارکو ہارڈ زکا کے اعصابی نظام اور رس پونے والے اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے۔
 بارکو اعصابی پیغامات کی ترسیل کو روک دیتا ہے جس سے ہارڈ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں اور جو اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔
 بارکو ہارڈ زکا خاص کر ہارڈ اور سفید ہارڈ کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لئے بہترین انتخاب۔
 طریقہ استعمال: کیڑا ظاہر ہونے پر فوری 150 گرام فی ایکڑ پھرسے کریں۔



رہسبل/سیمازول

بلا سٹ، ہارڈ اسپاٹ اور باقی تمام بیماریوں کا بہترین کنٹرول
 رہسبل دو جدید پروڈکٹ کا کچھ ہے جو دھان کی تمام بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے
 رہسبل دھان کی ٹیک بلا سٹ اور ڈالنے کی بلا سٹ کا بہترین کنٹرول کرتی ہے
 رہسبل بلا سٹ کے علاوہ براؤن سپاٹ، شیڈر بلا سٹ، اور تیرہ براؤن سپاٹ کا بھی خاتمہ کرتی ہے
 رہسبل کے پودے پر مثبت اثرات کی وجہ سے پیداوار زیادہ
 رہسبل پودے میں کیمیکل کی مقدار بڑھا دیتی ہے جس سے دانے چمکدار ہوتے ہیں
 رہسبل صاف شفاف ہونے کی وجہ سے دھان کی قیمت سٹڈی میں زیادہ ہوتی ہے
 طریقہ استعمال: رہسبل 125 لیٹر فی ایکڑ کو پھرسے کریں اور 10 دن بعد پھرسے دہرائیں
 سیمازول 100 لیٹر فی ایکڑ کو پھرسے کریں اور 10 دن بعد پھرسے دہرائیں



سپاسٹ فکس سپٹ

سپاسٹ فکس سپٹ: اگزن کا پرکامرب زہر ہے
 سپاسٹ فکس سپٹ: خلاف بیماری کی قوت مزاحمت نہیں ہے اسی لئے بیماری کا خاتمہ نہیں ہے
 طریقہ استعمال: بیماری نظر آنے پر 200 لیٹر فی ایکڑ پھرسے کریں



Tara Crop Sciences Private Limited

دھان

پچھلے دھان خوشحال دھان

دھان کی تمام جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے خاتمہ

بینٹا کلور: دو جدید مائیکرو (پریٹاکلور اور سلفیو ران) کا کچھ ہے
 بینٹا کلور: گھاس نما جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول
 بینٹا کلور: پیدوار میں چھٹی اضافہ
 بینٹا کلور: پودے اور فصل کے لئے موزوں بہترین کچھ
 بینٹا کلور: اگنے سے پہلے مرچ ہوئی، چوٹی، کھجوریں اور جوہوں کا خاتمہ
 طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے بعد 300 گرام بینٹا کلور کا گھنٹریوٹل میں مخلوط بنا کر گھنٹریوٹل سے ایک ایکڑ میں چھڑکا کریں



اگنے کے بعد ڈیلا اور سخت جان جڑی بوٹیوں کا خاتمہ

میٹیور: دو جدید زہروں پاؤڈر اور سلفیو ران اور ہارڈ ایک سوڈیم کا مرکب ہے
 میٹیور: جڑی بوٹی میں امائیو لیسڈ کا خاتمہ کرتی ہے اور بہت سارے انڈیکس کو ختم کر کے مارتی ہے
 میٹیور: تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کو سوانگی ڈھان، ڈیلا، چوٹی، مرچ بوٹی اور تمام گھاس نما جڑی بوٹیوں کو ختم تلف کرتی ہے
 طریقہ استعمال: پھول کی منتقلی سے قبل فصل میں جڑی بوٹیوں کے اگاؤ کے بعد 3 پتوں کے مرطے پر 100 گرام فی ایکڑ پھرسے کریں اور 24 گھنٹے بعد پانی لگائیں
 زہری میں جڑی بوٹی کے اگاؤ کے بعد 100 گرام فی ایکڑ پھرسے کریں اور 24 گھنٹے بعد پانی لگائیں



گھوڑا گھاس اور سخت جان جڑی بوٹیوں کا خاتمہ

پانی مور: پانی مور اور سا بیلیو قاب پونائل کا مرکب جڑی بوٹی مارڈ ہے
 پانی مور: گھوڑا گھاس اور دھان کی باقی تمام جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتا ہے
 پانی مور: پھرسے کے چند دن بعد زراعت متاثر شروع ہو جاتا ہے
 پانی مور: دھان اور دھان کی زہری میں کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے
 طریقہ استعمال: پھرسے سے پہلے پانی نکال کر 300 سے 600 لیٹر فی ایکڑ پھرسے کر کے ایک دن کے وقفے سے پانی لگائیں



تارا پائینڈان

تارا پائینڈان سے کی سٹڈیوں کا مکمل اور موثر عمل
 تارا پائینڈان: ایٹر نیٹیل شیڈر ڈو کو اٹنی
 تارا پائینڈان: ہر داتہ گرہ تھوڑے ریگولیر کے ساتھ جوڑ کے فصل کو سرسبز و شاہد
 تارا پائینڈان: سے کی سٹڈیوں کے ساتھ ساتھ پتہ پیٹ سٹڈی کا مکمل خاتمہ
 تارا پائینڈان: سلف کو لڈ ایک سائز کے دانے جس سے فصل پر انتہائی مثبت اثرات
 طریقہ استعمال: پھیری کی منتقلی کے 30 سے 35 دن کے بعد بحساب 9 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں



برائے مزید معلومات و رابطہ:
 انجم الیاس (سیلز مین) 0301-8388837
 ارشد حسین (سیلز مین) 0300-0308226
 مسکن باال (سیلز مین) 0300-0308228
 مسکن نیازی (سیلز مین) 0302-8381113
 مسکن نیازی (سیلز مین) 0302-8381117
 معرفت احمد جانی (سیلز مین) 0300-0308225
 محمد صفدر (سیلز مین) 0302-8381117

Head Office: Tara Group Pakistan | Head Office/Plant: Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM, Thokar Niaz Baig, Lahore | www.facebook.com/TaraGroupOfficial/ | Web: www.taragroup.com.pk

UAN: +92-42-111-22-33-88



زنک اور دوسرے ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی۔ راک گولڈ

- ★ راک گولڈ: ملٹی مائیکرو نیوٹریمنٹ ہے جس میں زنک، آئرن اور میگنیشیم موجود ہیں۔
 - ★ راک گولڈ: پودے کو درکار اہم غذائی اجزاء کی ضروریات پوری کر کے خوراک بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
 - ★ راک گولڈ: نائٹروجن اور سلفر کی موجودگی سے فصل سرسبز اور تروتازہ رہتی ہے اور پودا بیرونی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔
 - ★ راک گولڈ: نشوونما میں توازن پیدا کر کے پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
- طریقہ استعمال: پھیری منتقلی کے 25 تا 30 دن بعد 4 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔



دانوں کی متوازن بھرائی اور وزن کے لئے۔ تارا فیکس

- ★ تارا فیکس: بورون قدرتی کھاد ہے جو پودے میں بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہے اور یہ پودے کے پتوں میں جمع شدہ خوراک کی مونجر کی طرف ترسیل کرتی ہے۔
 - ★ تارا فیکس: عمل زیرگی میں معاونت کر کے اور نشوونما کو بڑھا کر پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔
 - ★ تارا فیکس: مونجر میں خالی دانوں کا بہترین حل۔
 - ★ تارا فیکس: دانوں کی لمبائی، موٹائی اور وزن میں اضافہ۔
- طریقہ استعمال: گوبھ کے مرحلہ میں تارا فیکس بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔

فصل شاندار، چاول چمکدار۔ تاراکنگ

- ★ تاراکنگ: نائٹروجن، فاسفورس اور پوناش متوازن مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے غذائی پودے کو فوری فراہمی۔
 - ★ تاراکنگ: حل پذیر ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر پودے میں جذب ہوتا ہے اور فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔
 - ★ تاراکنگ: پودے کی نشوونما، بڑھوتری اور مونجر کی بھرائی میں توازن پیدا کر کے پیداوار بڑھاتا ہے۔
 - ★ تاراکنگ: چاول کی رنگت میں نکھار اور دانے کے سائز کو بڑھاتا ہے۔
- طریقہ استعمال: جھاز مکمل ہونے پر اور دوسری مرتبہ دانہ بننے کے مرحلہ پر 1 کلوگرام فی ایکڑ سپرے کریں یا 5 کلوگرام فی ایکڑ فلڈ کریں۔



ٹوٹے سے محفوظ، شاندار اور چمکدار چاول۔ لینڈسٹار

- ★ لینڈسٹار: دانے کے سائز اور کوالٹی میں اضافہ نتیجتاً زیادہ پیداوار اور منافع۔
 - ★ لینڈسٹار: دانے وزن دار، صحتمند اور ٹوٹے سے محفوظ جس سے پیداوار میں اضافہ۔
 - ★ لینڈسٹار: سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ۔
 - ★ لینڈسٹار: فصل ہری بھری اور صحتمند و توانا۔
- طریقہ استعمال: دانہ بننے کے مرحلہ میں لینڈسٹار بحساب 1 لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔



Tara Group



دھان خوشحال کسان

زمینی اصلاح اور پودے کو غذائی اجزاء کی ترسیل۔ روٹ فیڈ +



- ★ روٹ فیڈ +: ایک نامیاتی کھاد ہے جس میں نامیاتی مادہ، سی ویڈ، سلفر، زنک، پوناش، میگنیشیم اور دوسرے غذائی اجزاء شامل ہیں۔
 - ★ روٹ فیڈ +: میں نامیاتی مادہ، الیٹنک ایسڈ اور تمام مائیکرو نیوٹریمنٹ شامل ہیں۔
 - ★ روٹ فیڈ +: زمین کی ساخت کو بہتر بنا کر زمین کی زرخیزی اور کھادوں کی افادیت کو بڑھاتا ہے۔
 - ★ روٹ فیڈ +: پودے کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کر کے بہترین ابتدائی نشوونما کا آغاز کرتی ہے۔
 - ★ روٹ فیڈ +: سے پودوں کی جڑیں لمبی، مضبوط اور توانا ہوتی ہیں۔
- طریقہ استعمال: زمین کی تیاری کے وقت 10 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ دے کر ہل چلائیں۔

زمینی کدو نرم رکھنے کے لئے۔ لینڈمکس



- ★ لینڈمکس: زمینی نامیاتی مادہ کی مقدار میں اضافہ۔
 - ★ لینڈمکس: زمین کی ساخت میں بہتری اور پانی کھڑا رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ۔
 - ★ لینڈمکس: گچھ نما جڑوں کو پھیلنے کے لئے نرم اور بھر بھری زمین مہیا کرتا ہے۔
 - ★ لینڈمکس: روٹ ہمیز کی تعداد کو بڑھاتا ہے جس سے پودے کھادیں لیتے ہیں۔
- طریقہ استعمال: 8 کلوگرام فی ایکڑ بوقت زمین تیاری دیگر کھادوں کے ساتھ ملا کر چھڑ کریں۔

پودے اور زمین کے افعال کی درنگی۔ ریبیرون



- ★ ریبیرون: پوناش، ہوٹک ایسڈ اور فلوک ایسڈ کا مرکب ہے۔
 - ★ ریبیرون: پودے اور زمین کے افعال کو درست کر کے زمین میں پڑی کھادیں پودے کے قابل استعمال بنائے۔
 - ★ ریبیرون: پودے کی جھاز بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
 - ★ ریبیرون: پودے کو مختلف سٹریس سے بچاتا ہے۔
- طریقہ استعمال: پھیری منتقلی کے 15 تا 20 دن بعد 4 لیٹر فی ایکڑ فلڈ کریں۔

دھان کی بہترین بڑھوتری اور بھر پور پیداوار کے لئے۔ تارا زنگ 27 / تارا زنگو



- ★ جدید ترین پلانٹ پر تیار کردہ، زنک کی پوری مقدار۔
 - ★ غذائی ترسیل میں اضافہ اور دانے کی رنگت صاف۔
 - ★ بڑھوتری کے ہارمون (آئرن) بنانے میں کردار ادا کر کے نشوونما میں باقائدگی اور توازن۔
 - ★ جھاز بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
- طریقہ استعمال: پھیری منتقلی کے 12 سے 18 دن بعد تارا زنگ 27 بحساب 3 کلوگرام فی ایکڑ یا تارا زنگو 27 بحساب 5 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں۔

معارف احمد سجانی (پاکستان سول سائنس) 0300-0308225
 محسن بلال (پاکستان سول سائنس) 0300-0308228
 ارشد حسین (پاکستان سول سائنس) 0300-0308226
 اسحاق اللہ (پاکستان سول سائنس) 0301-8388837
 شعیب اللہ (پاکستان سول سائنس) 0302-8380380
 نذر کندی (پاکستان سول سائنس) 0300-0308299
 حسین نیازی (پاکستان سول سائنس) 0302-8381113
 شمس الدین (پاکستان سول سائنس) 0302-8381117

Head Office: Tara Group Pakistan | Head Office/Plant: Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM, Thokar Niaz Baig, Lahore | www.facebook.com/TaraGroupOfficial/ | Web: www.taragroup.com.pk