



TARA-788

منافع بخش دھان

- بہترین ابتدائی نشوونما اور شاندار پیداواری صلاحیت والا ہائبرڈ
- مناسب قدر، فصل گرنے سے محفوظ
- وزنی دانے اور دانوں کی زیادہ تعداد
- گرمی برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت
- بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت
- پیداواری صلاحیت 150 من فی ایکڑ

دقت کاشت پیڑھے برائے لوئر سندھ 1 اپریل تا 30 جون
دقت کاشت پیڑھے برائے اچھڑ سندھ، بلوچستان 15 مئی تا 15 جولائی



تارا ہائبرڈ دھان کی کاشت کیلئے کھادوں کے استعمال کی سفارشات

وقت	فاسفورس فی ایکڑ	نائٹروجن فی ایکڑ	پوشائی فی ایکڑ
زمین کی تیاری کے وقت	ڈیپ ڈی + DAP + لیپٹوٹین / میلوڈی ہیومکٹ 8 کلوگرام	-----	ایک بوری SOP
جنتی ہفتے کے 15 دن بعد	-----	پوریا 1 بوری، تارا تک 27% / امیڈیل زینک 27% 3 کلوگرام، نیکنل / مینیکا 2 کلوگرام	-----
جنتی ہفتے کے 30-35 دن بعد	-----	1 بوری پوریا	3 لیٹر لیپٹوٹین / امیڈیل ہیومکٹ

تارا کی مذکورہ بالا ہائبرڈ اقسام سے دھان کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کیلئے تارا / آئی سی ایس کا درج ذیل پروگرام اپنائیں اور بہترین پیداوار حاصل کریں۔

الف - دھان کی فصل کی نگہداشت

- زمین نرم اور بھر پوری رکھنے کے لئے زمین کی تیاری کے وقت نامیاتی مادہ **زیوسٹ فیڈ +** 10 کلوگرام اور **لیپٹوٹین** / **میلوڈی ہیومکٹ** 8 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں
- دھان کی بہترین ابتدائی بڑھوتری اور زینک کی کمی پوری کرنے کے لئے **تارا تک 27%** / **امیڈیل زینک 27%** بحساب 3 کلوگرام فی ایکڑ یا **تارا تک مینیکا** / **کمب زینک** 3 لیٹر فی ایکڑ ہفتے کے 12 سے 18 دن کے اندر استعمال کریں۔
- دانوں کی مکمل بھرائی اور وزن کیلئے **تارا فیکس** / **امیڈیل فیکس** 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کو بھوکے مرحلے پر اسپرے کریں۔
- فصل کا آخری مراحل میں گرنے (Lodging) سے بچانے اور دانوں کی بہترین کوانٹیٹی اور وزن کیلئے **تارا تک** / **امیڈیل تک** بحساب 5 کلوگرام فی ایکڑ دانے بننے کے مرحلے پر فٹھڑ کریں۔
- 50 دن کی فصل پر 3 لیٹر **لیپٹوٹین** / **امیڈیل مسٹار** فٹھڑ کریں۔



ب - دھان کی فصل کی حفاظت کیلئے تارا / آئی سی ایس کا پروگرام

- 1 جڑی بوٹیوں کا کنٹرول: **بیننا کلور** / **پرو پا کلور** 300 گرام فی ایکڑ جنتی کی ہفتے کے بعد 3 دن کے اندر 6 لیٹر فی ایکڑ میں مکھول بنا کر ٹیکر بوتل کے ساتھ کھڑے پانی میں استعمال کریں۔
• **میٹیور / ڈائی کام** بحساب 100 گرام فی ایکڑ اور گودا کھاس کو کنٹرول کرنے کیلئے **بائی مور / مور او بیس** بحساب 300-600 ملی لیٹر فی ایکڑ ہفتے کے 15 سے 20 دن بعد اسپرے کریں
- 2 کیڑوں کا کنٹرول: سن کی سنڈی کے موثر کنٹرول کیلئے **تارا ایمینان / فل ٹاس** بحساب 9 کلوگرام یا **آٹونیکس** بحساب 6 کلوگرام فی ایکڑ دو مرتبہ بھٹھڑ کریں۔
• پھلپھٹ سنڈی کے کنٹرول کیلئے **ونڈال** 80 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں۔
• سفید پھٹ والے تیلے اور براؤن ہاپ کے لئے **بارکو** 150 گرام فی ایکڑ اسپرے کریں۔
- 3 بیماریوں کا کنٹرول: بلاسٹ (بھھکا) براؤن سپاٹ اور دیگر تمام بیماریوں کے کنٹرول کیلئے **رسبل** 125 ملی لیٹر اور **سیمبلول / ٹیٹو سٹین** 100 ملی لیٹر کو بھوکے حالت پر اسپرے کریں اور 15 دن بعد اسپرے دوہرائیں۔



نوٹ

مذکورہ بالا ہائبرڈ کیلئے دی گئی سفارشات گزشتہ چند سالوں کی تحقیق کی بنیاد پر دی گئی ہیں، تاہم موسمی حالات میں غیر متوقع تبدیلی مثلاً (پھول آنے پر عت گری، بارش یا آندھی طوفان) پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں جو کہ کھیتی کے دائرہ اختیار میں نہیں اور کھیتی کسی قسم کے نقصان کی ذمہ دار نہ ہوگی کھیتی کے آگے اور خاص طور پر پانی کی سطح کے مطابق کاربئی دینی ہے۔

جام مسعود احمد (جنرل منیجر سیکلر ایڈمنسٹریٹو) ساؤتھ ریجن

0321-7373794

- محمد علی (سیکرٹری جنرل) حیدرآباد 0300-0659098
- محمد امجد (سیکرٹری جنرل) کوئٹہ 0345-0040598
- عمار شاہ (سیکرٹری جنرل) راولپنڈی 0300-0262845
- عدنان آصف (سیکرٹری جنرل) سرحد 0300-0302542
- راجن علی (سیکرٹری جنرل) کراچی 0300-0303101
- شاد (سیکرٹری جنرل) سندھ 0300-0302511
- زہیر حسن (سیکرٹری جنرل) لاہور 0321-2178627
- عتیق احمد (سیکرٹری جنرل) پنجاب 0300-0308314
- نجیب اللہ (سیکرٹری جنرل) خیبر پختونخوا 0300-0308328
- اظہار احمد (سیکرٹری جنرل) گلگت بلتستان 0302-8380505
- آتب احمد (سیکرٹری جنرل) خیبر پختونخوا 0300-0723354
- محمد انوار (سیکرٹری جنرل) گلگت بلتستان 0300-0201159

Tara Group Pakistan

Head Office/Plant:
Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM, Thokar Niaz Baig, Lahore

Web: www.taragroup.com.pk

UAN: +92-42-111-22-33-88



TARA-788

منافع بخش دھان

- بہترین ابتدائی نشوونما اور شاندار پیداواری صلاحیت والا ہائبرڈ
- مناسب قدر، فصل گرنے سے محفوظ
- وزنی دانے اور دانوں کی زیادہ تعداد
- گرمی برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت
- بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت
- پیداواری صلاحیت 150 من فی ایکڑ

وقت کاشت پیپری برائے پنجاب 15 اپریل تا 30 جون

نوٹ: 25 سے 30 دن کی پیپری منتقل کریں۔ بصورت دیگر پیداوار میں واضح کمی واقع ہو سکتی ہے۔



تارا ہائبرڈ دھان کی کاشت کیلئے کھادوں کے استعمال کی سفارشات

وقت	فاسفورس فی ایکڑ	نائٹروجن فی ایکڑ	پوناش فی ایکڑ
زمین کی تیاری کے وقت	ڈی اے پی + ڈی اے پی + ڈی اے پی / میٹریل ہیبٹک 8 کلوگرام	-----	ایک بوری SOP
جانوری منتقلی کے 15 دن بعد	-----	پوریا 1 بوری، تارا تک 27% / امیڈیل زینک 27% 3 کلوگرام + نیکیل / سینیٹک 2 کلوگرام	-----
پہلی منتقلی کے 30-35 دن بعد	-----	1 بوری پوریا	3 لیٹر لیٹیکسٹار / امیڈیل مسٹار

تارا کی مذکورہ بالا ہائبرڈ اقسام سے دھان کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کیلئے تارا / آئی سی ایس کا درج ذیل پروگرام اپنائیں اور بہترین پیداوار حاصل کریں۔

الف - دھان کی فصل کی نگہداشت

- زمین نرم اور بھر پوری رکھنے کے لئے زمین کی تیاری کے وقت نامیاتی مادہ **زیوٹ فیکٹ +** 10 کلوگرام اور **لیٹیکسٹار** / **میٹریل ہیبٹک** 8 کلوگرام فی ایکڑ چھڑ کریں
- دھان کی بہترین ابتدائی بڑھوتری اور زینک کی کمی پوری کرنے کے لئے **تارا تک 27%** / **امیڈیل زینک 27%** بحساب 3 کلوگرام فی ایکڑ یا **تارا تک سیٹو** / **کمب زینک** 3 لیٹر فی ایکڑ منتقلی کے 12 سے 18 دن کے اندر استعمال کریں۔
- دانوں کی مکمل بھرائی اور وزن کیلئے **تارا فیکسٹار** / **امیڈیل فیکسٹار** 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کو بھوکے مرحلے پر اسپرے کریں۔
- فصل کا آخری مراحل میں گرنے (Lodging) سے بچانے اور دانوں کی بہترین کٹائی اور وزن کیلئے **تارا تک** / **امیڈیل تک** بحساب 5 کلوگرام فی ایکڑ دانے بننے کے مرحلے پر فھڑ کریں۔
- 50 دن کی فصل پر 3 لیٹر **لیٹیکسٹار** / **امیڈیل مسٹار** فھڑ کریں۔



ب - دھان کی فصل کی حفاظت کیلئے تارا / آئی سی ایس کا پروگرام

- جڑی بوٹیوں کا کنٹرول: **بیننا کلور** / **پرو پا کلور** 300 گرام فی ایکڑ پیپری کی منتقلی کے بعد 3 دن کے اندر 6 لیٹر پانی میں مخلوط بنا کر فیکر بول کے ساتھ کھڑے پانی میں استعمال کریں۔
- میٹیور** / **ڈائی کالم**: بحساب 100 گرام فی ایکڑ اور گودا کھاس کو کنٹرول کرنے کیلئے **بائی مور** / **موراویکس** بحساب 300-600 ملی لیٹر فی ایکڑ منتقلی کے 15 سے 20 دن بعد اسپرے کریں
- کیڑوں کا کنٹرول: سنی کی سنڈی کے موثر کنٹرول کیلئے **تارا اینٹینا** / **فل ٹاس** بحساب 9 کلوگرام یا **آٹونیکس** بحساب 6 کلوگرام فی ایکڑ دو مرتبہ بھڑ کریں۔
- پہ لپٹ سنڈی کے کنٹرول کیلئے **ونڈال** 80 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں۔
- سفید پست والے تیلے اور براؤن ہاپ کے لئے **بارکو** 150 گرام فی ایکڑ اسپرے کریں۔
- بیماریوں کا کنٹرول: بلاسٹ (بھسکا) براؤن سپاٹ اور دیگر تمام بیماریوں کے کنٹرول کیلئے **رسبل** 125 ملی لیٹر اور **سیمبلول** / **ٹیٹو سٹیڈ** 100 ملی لیٹر کو بھوکے حالات پر اسپرے کریں اور 15 دن بعد اسپرے دوہرائیں۔



نوٹ

مذکورہ بالا ہائبرڈ کیلئے دی گئی سفارشات گزشتہ چند سالوں کی تحقیق کی بنیاد پر دی گئی ہیں، تاہم موسمی حالات میں غیر متوقع تبدیلی مثلاً (پھول آنے پر سخت گرمی، بارش یا آندھی طوفان) پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں جو کہ کھیتی کے دائرہ اختیار میں نہیں اور کھیتی کسی قسم کے نقصان کی ذمہ دار نہ ہوگی کھیتی کے آگے اور خالص پان کی لینل کے مطابق کاربئی دینی ہے۔

جام مسعود احمد (جنرل مینیجر سٹراٹیکٹک مارکیٹنگ) ساہتھ رجین 0321-7373794

- 0300-0201981
- 0300-0262737
- 0345-0040540
- 0302-8381119
- 0300-0806960
- 0300-0262809
- 0300-0262273
- 0300-0262872
- 0300-0806961
- 0300-0806962
- 0300-6579247
- 0300-0806965
- 0300-0303118
- 0300-0806965
- 0300-0645891
- 0300-6579232
- 0300-6579217
- 0300-0303023

Tara Group Pakistan | Head Office/Plant: Chunnia Bypass Road, Raiwind, 28-KM, Thokar Niaz Baig, Lahore